

SCHEDA N° 0833 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE olivaceofuscus	AUTORE Kühner 1955	
DATA DI RACCOLTA 24.11.2024	LUOGO DI RACC. Bosco Nordio	COMUNE S.Anna di Chioggia	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 2 m	I.G.M. 169-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI
☐ TERRENO NUDO
☐ TORBIERA
☐ ARGINE DI FIUME

☐ ORTI E GIARDINI
☐ TERRENO SABBIOSO
☐ TERRENO COLTIVATO A
☐ LUOGO BRUCIATO

☐ MARGINI DI STRADA
☐ ARENILE
☐ BOSCO SUBALPINO
☐ RADO
☒ FITTO

☒ DENTRO AL BOSCO
☐ SU LEGNO

☐ AI MARGINI DEL BOSCO
☐ VIVO
☐ MORTO

DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA
☒ OMBROSA
☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO
☐ MOLTO UMIDO
☒ UMIDO
☐ ASCIUTTO
☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : Rinvenuti numerosi esemplari isolati in un sentiero interno.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, irregolarmente verrucose, 6.5-8.0 x 4.6-5.4 µ.


BIBLIOGRAFIA : ANTONINI D., ANTONINI M., CONSIGLIO G. – IL GENERE CORTINARIUS IN ITALIA (2)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI
☒ FRESCHI
☐ SECCHI



CARPOFORI



SPORE



BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo conico-campanulato, con largo umbone ottuso; superficie non igrofana, sericea, con fibrille radiali innate, di colore giallo-brunastro con toni olivacei, più scuro nella regione centrale.

Lamelle adnate, ventricose, poco fitte, intercalate a lamellule, di colore ocre-olivastro; filo debolmente eroso, più chiaro.

Stipite cilindrico, bulbo basale poco marcato, fibrilloso, concolore alle lamelle; cortina giallastra.

Carne fibrosa, di colore giallo-olivastro.

Microscopia. Spore ellissoidali, irregolarmente verrucose, di 6.5-(7.24)-8.0 x 4.6-(4.97)-5.4 μ , con Q: 1.31-(1.46)-1.57; basidi clavati, tetrasporici.