

SCHEDA N° 0866 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE subturbinatus	AUTORE Rob. Henry 1939	
DATA DI RACCOLTA 08.10.2023	LUOGO DI RACC. Lavarone	COMUNE Lavarone	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 081-I	RACCOGLITORE Franco Fratta	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Latifolia mista		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☒ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO


VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti alcuni semplari in una radura.

MICROSCOPIA: Spore da amigdaliformi a citriformi, verrucose, di 10.5-11.4 x 6.3-7.2 µ.

BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (3)

DETERMINATORE Franco Fratta

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo piano-convesso, di circa 4-5 cm di diametro; cuticola glutinosa, di colore brunastro, con lembi di velo biancastri; orlo fortemente involuto.

Lamelle smarginate; di colore bianco grigiastro, a filo seghettato.

Stipite cilindrico, la base terminante con un bulbo largo e piatto, leggermente inclinato sul gambo; di colore biancastro.

Carne biancastra; odore fruttato, sapore dolciastro.

Microscopia. Spore da amigdaliformi a citriformi, verrucose, di 10.5-(11.21)-11.4 x 6.3-(6.75)-7.2 μ , con Q: 1.49-(1.67)-1.75.