

SCHEDA N° 0842 AMS_PD
ORDINE Agaricacales

GENERE Cylindrobasidium	SPECIE laeve	AUTORE (Pers.) Chamuris 1984	
DATA DI RACCOLTA 10.02.2025	LUOGO DI RACC. Brusegana	COMUNE Padova	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 20 m	I.G.M. 126-II	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☒ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI :		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☒ SU LEGNO	☐ VIVO ☒ MORTO	DI Juglans nigra

ESPOSIZIONE:
☒ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☒ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE :

MICROSCOPIA: Spore di 8.4 x 6.1 µm.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F., CHAMPIGNONS DE SUISSE (2) – ED. MYCOLOGIA

 DETERMINATORE **Franco Manganelli**

 RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI



CARPOFORI




CARPOFORI



CARPOFORO (DETTAGLIO)



BASIDI



BASIDI - SPORE



SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Carpoforo resupinato, aderente al substrato (corteccia), da cui si stacca con una certa facilità; di colore crema-brunastro molto chiaro; carne sottilissima, membranosa; trovato su rametto a terra di noce nero molto deteriorato; sistema ifale monomitico, presenza di GAF, spore $8.4 \times 6.1 \mu\text{m}$; presenza di leptocistidi; esemplari molto vecchi che nell'insieme misuravano oltre 20 cm.