

SCHEDA N° 0851 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE Inocybe	SPECIE cervicolor	AUTORE (Pers.) Quél. 1886	
DATA DI RACCOLTA 14.07.2025	LUOGO DI RACC. Val Mesta	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 062-I	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Misto Faggio e Abete rosso		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☒ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☒ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti tre esemplari tra erba e muschio.

MICROSCOPIA: Spore lisce, ellissoidali, 11-12 x 6-7 µ.



BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1). A.M.B.

DETERMINATORE Franco Manganelli

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

CARPOFORI

CARPOFORI

SPORE

SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo conico-convesso, con apice arrotondato, poi leggermente spianato; margine involuto, superficie ricoperta da squamette fibrose fortemente rialzate (specialmente verso il disco) di colore marrone (aspetto quasi squamoso); il disco si presenta molto unito.

Lamelle adnate, poi quasi staccate al gambo, inizialmente grigio-biancastre poi bruno rossiccio con filo quasi biancastro.

Gambo cilindrico, slanciato, color ocre-brunastro con fibrille longitudinali concolori.

Carne scarsa, fibrosetta, biancastra poi brunastra; reazione con guaiaco verde-bluastro quasi subito.

Microscopia. Spore lisce, ellissoidali, di 11-12 x 6-7 μ di grandezza; non osservati cistidi; sporata ocre rossiccia.