

SCHEDA N° 0831 AMS_PD

ORDINE Tricholomatales

GENERE <i>Mycena</i>	SPECIE <i>aurantiomarginata</i>	AUTORE (Fr.) Quél. 1872	
DATA DI RACCOLTA 15.10.2024	LUOGO DI RACC. Colli Euganei	COMUNE Rovolon	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 250 m	I.G.M. 147-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI : Castagno e Robinia		☐ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☒ SU LEGNO	☐ VIVO ☒ MORTO	DI Castagno

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : Rinvenuti molti esemplari fascicolati.

MICROSCOPIA: Spore ovoidali-ellissoidali, amiloidi, 7.5- 9.0 x 5.1 µm.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (I) – A.M.B.

DETERMINATORE Franco Manganelli


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI




CARPOFORI



LAMELLE



SPORE



BASIDI E CISTIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello campanulato, con umbone centrale, di 2-3 cm di diametro; l'orlo si presenta leggermente striato e di colore bruno dattero con il margine giallo arancione.

Lamelle da adnate a leggermente decorrenti con dentino; fitte, di colore giallastro, con filo arancione vivace.

Gambo molto esile, cavo, pruinoso per tutta la sua altezza; di colore brunastro e con base radicante.

Carne molto sottile e di colore brunastro, quasi inodore ed insapore.

Microscopia. Spore ovoidali-ellissoidali, amiloidi, di 7.5- 9.0 x 5.1 μm ; basidi clavati; alcuni cistidi con ramificazione.