

SCHEDA N° 0864 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE <i>Mycena</i>	SPECIE <i>rorida</i>	AUTORE (Fr.) Quél. 1872	
DATA DI RACCOLTA 16.11.2025	LUOGO DI RACC. Vendevolo	COMUNE Galzignano	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 150 m	I.G.M. 147-IV	RACCOGLITORE Barbara Briard	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Latifolia mista		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☒ IN RADURE
☒ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO



VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti alcuni semplari su rami secchi.

MICROSCOPIA: Spore da ellissoidali a subcilindriche, apicolate, 9.1-10.5 x 4.1-4.4 µ.

BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (2)

DETERMINATORE Franco Fratta

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo covesso, depresso-ombelicato, di circa 2 cm di diametro; cuticola solcato-scanalata, di colore crema-ocraceo, radialmente striata.

Lamelle decorrenti, rade, biancastre.

Stipite cilindrico, di colore biancastro, ricoperto da una massa gelatinosa traslucida.

Carne inconsistente; odore e sapore non significativi.

Microscopia. Spore da ellissoidali a subcilindriche, apicolate, di $9.1-(9.62)-10.5 \times 4.1-(4.29)-4.4 \mu$, con Q: $2.05-(2.25)-2.57$; basidi con lunghi sterigmi.