

SCHEDA N° 0538 AMS_PD
ORDINE Agaricales

GENERE Agaricus	SPECIE litoralis	AUTORE (Wakef. & A. Pearson) Pilát	
DATA DI RACCOLTA 09.12.2019	LUOGO DI RACC. Porto Caleri	COMUNE Rosolina	PROV. RO
ALTITUDINE S.L.M. 1 m	I.G.M. 169-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☒ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Lecci e Pini a due aghi (prevalenti)		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☒ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO




VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti due esemplari isolati.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, debolmente apicolate, 5.8-6.7 x 3.8-4.3 µ.

BIBLIOGRAFIA : PARRA SÀNCHEZ L.A. – AGARICUS ALLOPSALLIOTA – FUNGI EUROPAEI

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

CISTIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo piano-convesso, di circa 5-6 cm di diametro, con basso umbone; cuticola asciutta, di colore crema-ocraceo, più scura al disco, desquamata in modo sempre più evidente verso il margine; margine sottile, eccedente le lamelle per resti di velo.

Lamelle piuttosto fitte, libere, irregolari, con lamellule; di colore crema-rosato.

Stipite cilindrico, pieno, ricurvo nella parte inferiore, un po' bulboso alla base dove compaiono sottili radichette; biancastro, con anello supero, piuttosto ampio; presenti evidenti striature longitudinali in prossimità della regione anulare e in tutta la regione apicale.

Carne soda, di colore biancastro, debolmente arrossante-imbrunente alla base.

Microscopia. Spore ellissoidali, debolmente apicolate, guttulate, a parete relativamente spessa, di $5.8-(6.17)-6.7 \times 3.8-(3.93)-4.3 \mu$, con Q: 1.45-(1.56)-1.69; basidi clavati, tetrasporici, $19.5-23.5 \times 6.2-7.5 \mu$; cistidi con cellule marginali cilindrico-clavate.