

SCHEDA N° 0528 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE Calocybe	SPECIE constricta	AUTORE (Fr.) Kühner	
DATA DI RACCOLTA 09.12.2019	LUOGO DI RACC. Forcellini	COMUNE Padova	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 12 m	I.G.M. 126-II	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☒ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI:		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☒ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☒ ASCIUTTO ☐ SECCO





VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti numerosi esemplari in aiuola sotto un Cedro.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali od ovoidali, fortemente verrucose, fino a ottusamente echinulate, 6.8-8.6 x 4.7-6.0 µ.

BIBLIOGRAFIA : MOSER M. – GUIDA ALLA DETERMINAZIONE DEI FUNGHI

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

EPICUTE

BASIDI

BASIDI (CARMINIO ACETICO)

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo piano convesso, di circa 6-7 cm di diametro negli esemplari più grandi, privo di evidente umbone; cuticola opaca, asciutta, vellutata, di colore bianco con sfumature crema-ocra pallido in particolare nella regione centrale; margine sottile, tendenzialmente involuto sull'estremo lembo, leggermente ondulato e un po' eccedente.

Imenio a lamelle, da sublibere a leggermente smarginate, piuttosto fitte, intercalate a numerose lamellule di lunghezza diversa, di colore crema-biancastro con riflessi ocracei; filo lamellare ondulato, talora un po' irregolare.

Stipite pieno, cilindrico ma leggermente arrotondato-clavato nella parte inferiore, più o meno marcatamente fittonante; biancastro con sfumature color crema-ocracee, superficie da feltrata fino a squamettata e flocculosa; alcuni esemplari apparivano conglobati.

Carne bianca, soda, fibrosa, piuttosto spessa; forte odore di farina e sapore decisamente amaro.

Microscopia. Spore ellissoidali od ovoidali, fortemente verrucose, fino a ottusamente echinulate, in molti casi crestate, di $6.8-(7.78)-8.6 \times 4.7-(5.14)-6.0 \mu\text{m}$, con Q: $1.44-(1.52)-1.62$; basidi clavati, tetrasporici, siderofili (carminio acetico), guttulati, di circa $26.0-35.0 \times 8.0-10.0 \mu\text{m}$; epicute costituita da ife cilindriche, intrecciate o fascicolate, a terminali arrotondati, di spessore $3.5-5.0 \mu\text{m}$; giunti a fibbia frequenti nei diversi tessuti.