

SCHEDA N° 0507 AMS_PD
ORDINE Helotiales

GENERE Chlorociboria	SPECIE aeruginascens	AUTORE (Nyl.) Kan.ex Ram., Korf & Bat.	
DATA DI RACCOLTA 17.08.2015	LUOGO DI RACC. Monte Bedolè	COMUNE Primiero S. Martino	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 900 m	I.G.M. 062-IV	RACCOGLITORE Franco Manganelli	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: <u>Misto</u>		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☒ SU LEGNO	☐ VIVO ☒ MORTO	DI <u>Latifoglie</u>

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☒ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Erbe e arbusti vari.
NOTE : Su un ramo umido molto degradato.
MICROSCOPIA: Spore cilindrico-fusoidi, 7.0-7.5 x 2.0 µ.
BIBLIOGRAFIA : COURTECUISSE R. – CHAMPIGNONS D'EUROPE
DETERMINATORE Franco Manganelli
RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

ASCOMI

ASCOMI

SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Carpofori a forma di un imbuto espanso, di 05-07 mm di diametro; gregario, di colore blu-verde-turchese molto particolare, con un piede molto piccolo, 2-3 mm di lunghezza.

La parte interna del tronco (sotto la corteccia) era tutta dello stesso colore degli ascomi.

Microscopia. Spore cilindrico-fusoidi, lisce, ialine, di circa 7.0-7.5 x 2.0 μ .