

SCHEDA N° 0514 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE atrovirens	AUTORE Kalchbr.	
DATA DI RACCOLTA 16.10.2019	LUOGO DIRACC. Seio	COMUNE Sarnonico	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1200	I.G.M. 026-III	RACCOGLITORE Giorgio Bortoletto	

HABITAT:

☒ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI:		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☒ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO



VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Presenza di Pini in prossimità della spianata erbosa.

MICROSCOPIA: Spore amigdaliformi e citriformi, verucose, 9.1-10.7 x 5.8-6.5 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (5) – MYCOLOGIA

DETERMINATORE Giorgio Bortoletto

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo piano-convesso, un po' gibboso, di circa 7 cm di diametro negli esemplari più grandi; margine involuto, sottile; cuticola molto vischiosa, di colore giallo-verdastro, fino a bruno-nerastro al centro.

Lamelle adnato-smarginate, intercalate a lamellule; di colore giallo sporco, con filo chiaro, leggermente eroso.

Stipite cilindrico, dotato con bulbo marginato, pieno; asciutto, giallo-verdastro (specie alla base), con resti di micelio.

Carne giallo-verdastra, specie alla base del gamb; odore non significativo, sapore acidulo.

Microscopia. Spore amigdaliformi e citriformi, con verruche grossolane, di 9.1-(10.03)-10.7 x 5.8-(6.0)-6.5 μ , con Q: 1.53-(1.67)-1.79; basidi clavati, tetrasporici, 23.0-32.5 x 7.4-10.4 μ , dotati di GaF.