

SCHEDA N° 0857 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE balteatoalbus	AUTORE Rob. Henry 1958	
DATA DI RACCOLTA 17.09.2025	LUOGO DI RACC. Lavarone	COMUNE Lavarone	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 081-I	RACCOGLITORE Franco Fratta	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI : Abete, Faggio, qualche Betulla		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☒ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :


NOTE :

MICROSCOPIA: Spore da ellissoidali a subamigdaliformi, moderatamente verrucose, 9.7-12.0 x 5.8-6.9 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. - FUNGI OF SWITZERLAND (5) - MYKOLOGIA

DETERMINATORE Franco Fratta

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

 CARPOFORI	 SPORE	

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da emisferico a piano-convesso, di circa 6 cm di diametro; superficie fibrillosa, di colore oca-rossastro, parzialmente ricoperta da velo biancastro (esemplari giovani); margine ricurvo.

Lamelle oca-brunastre, con filo più chiaro.

Stipite cilindrico-clavato, in alcuni casi bulboso, con superficie fibrillosa.

Carne biancastra, priva di odori o sapori particolari.

Microscopia. Spore da ellissoidali a subamigdaliformi, moderatamente verrucose, di 9.7-(9.98)-12.0 x 5.8-(6.22)-6.9 μ , con Q: 1.46-(1.77)-1.98.