

SCHEDA N° 0850 AMS_PD

ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE mussivus	AUTORE (Fr.) Melot 1987	
DATA DI RACCOLTA 24.08.2025	LUOGO DI RACC. Santa Fosca	COMUNE Selva di Cadore	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1500 m	I.G.M. 029-III	RACCOGLITORE Franco Fratta	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Peccio misto a qualche Faggio		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☒ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA
 ☒ OMBROSA
 ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO
 ☐ MOLTO UMIDO
 ☒ UMIDO
 ☐ ASCIUTTO
 ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :


NOTE : Rinvenuti dueemplari in una radura.

MICROSCOPIA: Spore da ellittiche a amigdaliformi, debolmente verrucose, 10.7-11.1 x 6.4-7.5 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (5)

DETERMINATORE Franco Fratta

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

 CARPOFORI	 SPORE	

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da campanulato a piano convesso, di circa 5 cm di diametro; cuticola debolmente untuosa, ocracea, più scura al centro, con debole striatura radiale; margine acuto.

Lamelle adnato-smarginate; di color bruno-giallastro.

Stipite cilindrico, con base clavata; di colore ocraceo, più chiaro alla base; tracce di velo brunastro.

Carne giallastra, di odore terroso, sapore debole.

Microscopia. Spore da ellittiche a amigdaliformi, debolmente verrucose, di 10.7-(11.38)-11.1 x 6.4-(6.88)-7.5 μ , con Q: 1.56-(1.65)-1.75.