

SCHEDA N° 0521 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE Cortinarius	SPECIE praestans	AUTORE (Cordier) Gillet	
DATA DI RACCOLTA 13.10.2019	LUOGO DI RACC. Arnica	COMUNE Castelfondo	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1400 m	I.G.M. 026-III	RACCOGLITORE Giorgio Bortoletto	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Misto di Abete e latifoglie		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☒ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☒ ASCIUTTO ☐ SECCO



VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuta una decina di esemplari in zona prativa con latifoglie e qualche rado Pino; esposizione a Sud.

MICROSCOPIA: Spore da amigdaliformi a fusiformi-citriformi, con verruche evidenti, 11.8-14.0 x 6.9-7.9 µ.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1) – A.M.B.

DETERMINATORE Giorgio Bortoletto

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo emisferico-globoso, di circa 4-5 cm negli esemplari maggiori; cuticola asciutta, un po' vischiosa, di colore bruno cioccolato, segnata nella periferia da rughe radiali, ricoperta sul bordo da residui biancastri del velo; margine involuto, sottile.

Lamelle sinuato-smarginate, piuttosto fitte; di colore grigiastro sfumato di violetto; filo lamellare biancastro.

Stipite cilindrico, allargato alla base in un bulbo non marginato, leggermente radicante; di colore biancastro, con ricoperto da spessi residui di velo generale bianco (funghi giovani).

Carne soda e spessa, di colore bianco con qualche sfumatura bruno-violetta; odore e sapore poco significativi.

Microscopia. Spore da amigdaliformi a fusiformi-citriformi, con verruche marcatamente evidenti, di 11.8-(12.21)-14.0 x 6.9-(7.39)-7.9 μ , con Q: 1,52-(1.66)-1,79; basidi clavati, tetrasporici, 29.5-34.5 x 9.0-10.5 μ , dotati di GaF; cellule terminali cilindriche.