

SCHEDA N° 0539 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE <i>Galerina</i>	SPECIE <i>clavata</i>	AUTORE (Velen.) Kühner	
DATA DI RACCOLTA 18.11.2019	LUOGO DI RACC. Parco	COMUNE Padova	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 12 m	I.G.M. 126-II	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☒ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI:		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti numerosi esemplari gregari.


MICROSCOPIA: Spore da ellissoidali ad amigdaliformi, debolmente verrucose, 11.1-14.0 x 6.3-7.6 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRÄNZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (5)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

CISTIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo emisferico-campanulato, di al più 2 cm di diametro, con basso umbone; cuticola igrofana, di colore giallo-ocraceo, più scura nella regione discale, striata per trasparenza; orlo sottile.

Imenio con lamelle, da annesse al gambo ad ascendenti, molto rade, intercalate a lamellule; di colore giallo-ocra fino a ocra rossastro.

Stipite cilindrico, flessuoso, slanciato, di colore giallo pallido, dotato di fibrille irregolari.

Carne giallina, fragile; odore non significativo.

Microscopia Spore da ellissoidali ad amigdaliformi, debolmente verrucose, di 11.1-(12.85)-14.0 x 6.3-(7.19)-7.6 μ , con Q: 1.64-(1.79)-1.87; basidi clavati, tetrasporici, 32.0-39.0 x 9.0-10.6 μ , privi di GaF; cheilocistidi lageniformi, capitulati, dotati di lungo collo.