

SCHEDA N° 0548 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE Hemymyca	SPECIE cucullata	AUTORE (Pers.) Singer	
DATA DI RACCOLTA 19.07.2020	LUOGO DI RACC. Vodo di Cadore	COMUNE Vodo di Cadore	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1250 m	I.G.M. 029-II	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete rosso, Nocciolo e Faggio		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Abete rosso e Nocciolo.

NOTE : Rinvenuta una trentina di esemplari al bordo di un sentiero.





MICROSCOPIA: Spore fusiformi, lisce, guttulate, di 8.2-10.5 x 3.5-4.3 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (3)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

RIZOIDI

SPORE

BASIDI

CHEILOCISTITI

EPICUTE (ELEMENTI)

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo irregolarmente campanulato, di 5-10 mm di diametro; epicute bianca, opaca, con aspetto un po' granulare; orlo irregolare, sottile.

Imenoforo a lamelle subdecorrenti, fitte; bianche con filo intero, concolore.

Stipite cilindrico, slanciato, con elementi miceliari alla base; di colore biancastro, quasi satinato.

Carne sottile, bianca, con odore e sapore non significativi.

Microscopia. Spore fusiformi, lisce, guttulate, di $8.22\text{--}(9.0)\text{--}10.52 \times 3.5\text{--}(4.06)\text{--}4.31 \mu$, con Q: $1.95\text{--}(2.22)\text{--}2.62$; basidi cilindrico-clavati, terasporici, $16.0\text{--}26.5 \times 3.6\text{--}6.2 \mu$, dotati di GaF; cheilocistidi (lungamente) fusiformi, $23.5\text{--}32.6 \times 3.4\text{--}6.3 \mu$; epicute di ife allungate su un substrato di ife fusiformi e talora subglobose.