

SCHEDA N° 0532 AMS_PD
ORDINE Thelephorales

GENERE Hydnellum	SPECIE peckii	AUTORE Banker	
DATA DI RACCOLTA 20.08.2018	LUOGO DIRACC. San Michele	COMUNE Castelrotto	PROV. BZ
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 027-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete rosso		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☒ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☒ ASCIUTTO ☐ SECCO


VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuta una decina di esemplari in 3-4 gruppetti concresciuti, nella spianata di una pecceta

MICROSCOPIA: Spore subglobose, angolose, tubercolate, 4.5-5.6 x 3.8-4.7 µ.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo turbinato, di circa 7-8 cm negli esemplari maggiori (saldati ad altri elementi pileali a formare un'unica struttura), appianato e gibboso, con marcata depressione centrale; cuticola da biancastra a bruno-rossastra, secernente (nei giovani) gocce di essudato vinoso; orlo ondulato, biancastro con zonature brunastre.

Imenoforo costituito da aculei sottili, decorrenti, relativamente lunghi, di colore bianco-brunastro (di più nella regione inferiore).

Stipite cilindrico nella parte infissa nel terreno (dove si presenta nerastro), quasi assente all'esterno.

Carne suberosa, di colore bruno-rossastro, zonata; sapore dolciastro.

Microscopia. Spore subglobose, angolose, tubercolate, di 4.5-(5.0)-5.6 x 3.8-(4.28)-4.7 μ , con Q: 1.05-(1.18)-1.3.