

SCHEDA N° 0513 AMS_PD
ORDINE Hydnaceae

GENERE <i>Hydnum</i>	SPECIE <i>rufescens</i>	AUTORE Schaeff.	
DATA DI RACCOLTA 16.10.2019	LUOGO DI RACC. Ljubno	COMUNE Ljubno	PROV. SLO
ALTITUDINE S.L.M. 550 m	I.G.M.	RACCOGLITORE GdS	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete bianco e Faggio		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO


VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti quattro esemplari in prossimità di Abete bianco.

MICROSCOPIA: Spore subsferiche, 7.8-9.5 x 7.1-9.3 µ.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1) – A.M.B.

DETERMINATORE GdS

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo piano, con depressione centrale, ondulato, di circa 5 cm nell'esemplare maggiore, di colore bruno-arancio, più chiaro (crema carico) sull'estremo margine.

Imenoforo costituito da aculei sottili, non decorrenti, di colore biancastro con riflessi crema-arancio.

Stipite cilindrico, talora incurvato alla base; colore da biancastro (specie nella regione superiore) fino ad arancio, con superficie un po' tomentosa.

Carne piuttosto fragile; odore trascurabile, sapore leggermente amarognolo.

Microscopia. Spore subsferiche, di 7.8-(9.15)-9.5 x 7.1-(8,39)-9.3 μ , con Q: 1.01-(1.09)-1.2; basidi tetrasporici.

Nota. Le dimensioni sporiali rilevate sono nettamente più grandi di quelle riportate in letteratura.