

SCHEDA N° 0475 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE <i>Hygrophorus</i>	SPECIE <i>chrysodon</i>	AUTORE (Batsch) Fr.
DATA DI RACCOLTA 11.09.2018	LUOGO DI RACC. Santa Fosca	COMUNE Selva di Cadore
ALTITUDINE S.L.M. 1600 m	I.G.M. 029-III	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese
PROV. BL		

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete (prevalente), Nocciolo e altre Latifoglie		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Abete rosso.



NOTE : Rinvenuta una decina di esemplari in uno slargo di un boschetto di conifere.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, lisce, guttulate, 8.5-8.8 x 4.3-5.8 µ.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (I), A.M.B.

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI E BASIDIOLI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da emisferico a convesso-pulvinato, di c.a. 6 cm di diametro nell'esemplare più grande; cuticola separabile, di colore iniziale bianco, quindi decolorata da lavature giallastre (specie all'orlo); orlo regolare, sottile, decorato da granulazioni gialle.

Lamelle subdecorrenti, spesse, spaziate, alternate a numerose lamellule; biancastre con sfumature carnacine e successivamente gialle.

Stipite cilindrico, slanciato, fibrilloso; di colore biancastro, con granulosità gialle nella regione superiore.

Carne biancastra; odore e sapore non significativi.

Microscopia. Spore ellissoidali, lisce, guttulate, di 8.5-(8.06)-8.8 x 4.3-(5.01)-5.8 μ , con Q: 1.48-(1.62)-1.71; basidi lungamente clavati, tetrasporici.