

SCHEDA N° 0526 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE <i>Inocybe</i>	SPECIE <i>corydalina</i>	AUTORE Quél.	
DATA DI RACCOLTA 21.09.2019	LUOGO DI RACC. Val di Sella	COMUNE Borgo Valsugana	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1050 m	I.G.M. 061-III	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Misto con prevalenza di Faggio		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☒ ASCIUTTO ☐ SECCO



VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuta una decina di esemplari nella schiarita di un boschetto misto, in presenaz di Faggi.

MICROSCOPIA: Spore da ovoidali a ellissoidali a subamigdaliformi, 7.8-11.6 x 5.3-6.8 µ.

BIBLIOGRAFIA : CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (2)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

CISTIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo conico-campanulato (funghi giovani), con ampio umbone, di circa 4 cm di diametro nell'esemplare più grande; epicute desquamata in piccole placche, di colore ocre-brunastro, con umbone verde ramato scuro; margine involuto, regolare, con fibrille radiali.

Lamelle adnato-smarginate, intercalate a lamellule di diversa lunghezza; di colore bianco sfutato di sfumato di crema-ocraceo; filo regolare, (molto) leggermente dentellato.

Stipite cilindrico, con base leggermente ingrossata, da pruinoso a fibrilloso; di colore biancastro nella parte apicale, ocraceo nella parte inferiore, in due esemplari con sfumature verdastre alla base.

Carne biancastra, fibrosa; odore dolciastro.

Microscopia. Spore da ovoidali a ellissoidali a subamigdaliformi, lisce, a parete spessa, bruno-gialline al MS, di 7.8-(9.08)-11.6 x 5.3-(5.82)-6.8 μ , con Q: 1.34-(1.6)-1.9; cistidi largamente ellissoidali, piuttosto tozzi, muricati, metuloidi, 43.6-45.7 x 15.7-17.9 μ ; epicute a ife parallele.