

SCHEDA N° 0135 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE Inocybe	SPECIE proximella	AUTORE P. Karst. 1883	
DATA DI RACCOLTA 18.06.2023	LUOGO DI RACC. Asiago	COMUNE Asiago	PROV. VI
ALTITUDINE S.L.M. 1050 m	I.G.M. 082-II	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI : Abetaia di Abete rosso (quasi esclusivo)		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO




VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti due esemplari tra gli sfagni.


MICROSCOPIA: Spore tubercolate allungate, 7.6-9.6 x 5.2-6.8 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (5)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

CHEILOCISTIDI

PLEUROCISTIDI

IFE EPICUTE (GAF)

IFE PIEDE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo emisferico-convesso, con basso umbone evidente, di 3-4 cm di diametro nell'esemplare più grande; cuticola radialmente fibrillosa, di colore bruno-castano, con residui (velari ?) più chiari; margine fimbriato.

Lamelle da strettamente adnate a debolmente smarginate, di colore biancastro-ocraceo; filo lamellare più chiaro, ciliato.

Stipite cilindrico, incurvato, privo di bulbo; di colore brunastro, con estese fibrille longitudinali biancastre.

Carne odore poco rilevante, sapore analogo.

Microscopia. Spore tubercolate allungate, di $7.6-(9.04)-9.6 \times 5.2-(6.23)-6.8 \mu$, con Q: $1.26-(1.46)-1.61$; cheilocistidi da largamente fusiformi a ventricosi, con parete spessa, in qualche caso debolmente muricati, $51.0-58.0 \times 19.0-21.0 \mu$; pleurocistidi simili, ma più slanciati; cellule piriformi assenti; ife della corteccia periclinali, con diametro $9.0-10.5 \mu$, debolmente incrostate e dotate di GaF; ife cistidiali nella parte superiore dello stipite.