

SCHEDA N° 0487 AMS_PD
ORDINE Russulales

GENERE <i>Lactarius</i>	SPECIE <i>decipiens</i>	AUTORE Quél.	
DATA DI RACCOLTA 14.10.2019	LUOGO DI RACC. Ljubno	COMUNE Ljubno	PROV. SLO
ALTITUDINE S.L.M. 450 m	I.G.M.	RACCOGLITORE GdS	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete bianco e Faggio		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO


VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Abete bianco e Faggio.




NOTE:
MICROSCOPIA: Spore da largamente ellissoidali a subsferiche, con creste poco marcate, 6.1-8.4 x 4.8-6.3 µ.

BIBLIOGRAFIA: KRANZLIN F. - FUNGI OF SWITZERLAND (6)

DETERMINATORE GdS

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

CISTIDI

EPICUTE (CELLULE DEL SUBSTRATO)

EPICUTE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo piano-depresso, (talora) con umbone acuto, di circa 4 cm di diametro nell'esemplare più grande; cuticola igrofana, rugolosa (specie al centro), di colore beige incarnato, più scuro al centro dove presenta toni bruno-rossastri chiari; margine sottile, diritto.

Lamelle da adnate a decorrenti, relativamente fitte, alternate a lamellule, di colore crema incarnato pallido; lattice (sulle lamelle) bianco sieroso.

Stipite cilindrico e slanciato; concolore al cappello, leggermente più scuro alla base, un po' più chiaro all'apice; presente una feltratura biancastra alla base.

Carne color crema, cedevole; odore di pelargonio, sapore amarognolo.

Microscopia. Spore da largamente ellissoidali a subsferiche, poco amiloidi, creste poco marcate connesse in bassi reticoli, di $6.1-(7.16)-8.4 \times 4.8-(5.78)-6.3 \mu$, con Q: $1.1-(1.24)-1.39$; basidi clavati, bi e terasporici, fino a $34.5-37 \times 11-11.3 \mu$; cistidi fusiformi, talora moniliformi; epicute con ife irregolari poggianti su un substrato di ife cilindriche.