

SCHEDA N° 0809 AMS_PD

ORDINE Tricholomatales

GENERE Lentinellus	SPECIE ursinus	AUTORE (Fr.) Kühner 1926	
DATA DI RACCOLTA 07.10.2024	LUOGO DI RACC. Basovizza	COMUNE Trieste	PROV. TS
ALTITUDINE S.L.M. 140 m	I.G.M. 110-III	RACCOGLITORE GdS (SLO)	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI : Latifolia (prevalenti Quercia e Castagno)		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☒ SU LEGNO	☐ VIVO ☒ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : **Rinvenuti numerosi esemplari su tronco in disfaccimento.**

MICROSCOPIA: **Spore subglobose, finemente verrucose, amiloidi, 3.6-4.4 x 2.9-3.7 µ.**


BIBLIOGRAFIA : **BREITENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (3) – ED. MYKOLOGIA**

DETERMINATORE **GdS (SLO)**


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI




CARPOFORI




SPORE




SPORE IN MELZER



BASIDI



LATICIFERE



TRAMA

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Cappello spatulato, quindi reniforme con breve stipite laterale; superficie tormentosa nella regione centrale e in quella prossima allo stipite, di colore bianco-crema, bruno scuro (tempo secco) in prossimità dello stipite.

Lamelle decorrenti, con lamellule; margine seghettato.

Gambo assente, o al più molto breve e laterale.

Carne sottile; odore aromatico, sapore acre.

Microscopia. Spore subglobose, finemente verrucose, guttulate, amiloidi, di $3.6-(3.98)-4.4 \times 2.9-(3.36)-3.7 \mu$, Q: $1.07-(1.19)1.26$; basidi cilindrico-clavati tetrasporici; cistidi polimorfi; presenti ife laticifere.