

SCHEDA N° 0546 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE <i>Melanoleuca</i>	SPECIE <i>friesii</i>	AUTORE (Bres.) Bon	
DATA DI RACCOLTA 25.11.2019	LUOGO DI RACC. Porto Caleri	COMUNE Rosolina	PROV. RO
ALTITUDINE S.L.M. 1 m	I.G.M. 169-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☒ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Leccio e Pino		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☒ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO


VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Esemplari rinvenuti in bosco litoraneo vicini a Lecci e Pini a due aghi.


MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, finemente verrucose, 5.5-7.7 x 4.1-5.2 µ.

BIBLIOGRAFIA : BON M., TRICHOLOMATACEAE, DOCUMENTS MYCOLOGIQUES (2)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

MELANOLEUCA POLIOLEUCA

SPORE

BASIDI

CHEILOCISTITIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo piano-depresso, di circa 4 cm di diametro nell'esemplare più grande, con basso e ampio umbone; cuticola di aspetto untuoso, di colore bruno, più cupo al disco e sfumato al bordo verso l'ocra-grigiastro; margine sottile.

Lamelle adnato-smarginate, leggermente ventricose, intercalate a numerose lamellule di diversa lunghezza, di colore bianco con riflessi ocracei; filo lamellare leggermente eroso.

Stipite subcilindrico, leggermente bulboso, bruno scuro, pruinoso per tutta l'estensione, con zona basale biancastra.

Carne piuttosto soda, biancastra ma imbrunente nello stipite fino a diventare bruno cupo/ bruno nerastro alla base; odore non significativo.

Microscopia. Spore per lo più ellissoidali, finemente verrucose, di $5.5-(6.73)-7.7 \times 4.1-(4.63)-5.2 \mu$, con Q: $1.2-(1.46)-1.64$; basidi cilindrico-clavati, $30.0-36.5 \times 7.2-8.5 \mu$; cistidi lageniformi, muricati, $45.0-64.0 \times 10.5-11.8 \mu$.

Nota. Nome corrente secondo ISF: *M. polioleuca*