

SCHEDA N° 0516 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE Melanoleuca	SPECIE robertiana	AUTORE Bon	
DATA DI RACCOLTA 10.10.2019	LUOGO DI RACC. Pradena	COMUNE Brez	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 026-III	RACCOGLITORE Giorgio Bortoletto	

HABITAT:

☒ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI:		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☒ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO




VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti in prossimità di Pini con esposizione a sud.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, ornate da verruche amiloidi grosse e isolate, 6,9-7,9 x 5,0-5,8 µ.

BIBLIOGRAFIA : BON M. – FLORE MYCOLOGIQUE D'EUROPE (2) – TRICHOLOMES

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE (MELZER)

BASIDI E BASIDIOLI

EPICUTE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo convesso con evidente umbone centrale, liscio, con aspetto untuoso, di circa 6 cm di diametro nell'esemplare più grande; colore bruno camoscio, marcatamente più scuro nella zona discale; margine ottuso.

Lamelle smarginate con dentino, fitte, intercalate a numerose lamellule di diversa misura; di colore biancastro con riflessi crema-ocracei; filo concolore.

Stipite cilindrico, ingrossato alla base; superficie concolore al pileo, fibrillosa (specie alla base); regione basale con residui miceliari bianchi.

Carne acquosa, biancastra, con blandi toni olivacei; odore e sapore non significativi.

Microscopia. Spore ellissoidali, ornate da verruche amiloidi piuttosto grosse e tendenzialmente isolate, di 6.9-(7.39)-7.9 x 5.0-(5.34)-5.8 μ , con Q: 1.24-(1.38)-1.5; basidi clavati, tetrasporici, 25.0-30.2 x 7.8-9.6 μ ; cistidi assenti.