

SCHEDA N° 0550 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE <i>Melanoleuca</i>	SPECIE <i>robusta</i>	AUTORE (Bres.) Fontenla, Gottardi & Para	
DATA DI RACCOLTA 21.08.2018	LUOGO DI RACC. Lago di Mezzo	COMUNE Nova Levante	PROV. BZ
ALTITUDINE S.L.M. 1600 m	I.G.M. 027-II	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: ABETE (PREVALENTE)		☐ RADO ☒ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☒ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Abete rosso e Nocciolo.




NOTE : Rinvenuti numerosi esemplari gregari, in qualche caso cespitosi, in una schiarita vicino a un sentiero.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, con verruche piuttosto grosse, 7.0-7.9 x 4.9-5.8 µ.

BIBLIOGRAFIA : BON M. – FLORE MYCOLOGIQUE D'EUROPE (2) – TRICHOLOMES

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDIE BASIDIOLI

CISTIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo da campanulato a convesso, con largo umbone centrale; superficie glabra, irregolare, con aspetto un po' untuoso, di circa 6-8 cm di diametro e con andamento marcatamente flessuoso negli esemplari più grandi; colore bruno nerastro, più chiaro al margine.

Lamelle adnato-smarginate, fitte, intercalate a numerose lamellule di diversa misura; di colore biancastro con riflessi ocracei; filo concolore.

Stipite cilindrico, un po' ingrossato alla base; di colore brunastro, con granulazioni (striature) biancastre; presenti residui miceliari.

Carne con toni ocr-brunastri; odore e sapore non significativi.

Microscopia. Spore ellissoidali, ornate da verruche piuttosto grosse, di 7.0-(7.47)-7.9 x 4.9-(5.31)-5.8 μ , con Q: 1.34-(1.41)-1.48; basidi clavati, tetrasporici, 27.0-38.6 x 8.0-9.5 μ ; cistidi fusiformi (talora arrotondati all'apice), con residui cristalliformi, 47.0-83.5 x 12-22 μ .

Sinonimi: *M. turrita*, *M. umbrinella*