

SCHEDA N° 0524 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE <i>Mycena</i>	SPECIE <i>galopus</i>	AUTORE (Pers.) P. Kumm.	
DATA DI RACCOLTA 09.11.2019	LUOGO DI RACC. Bosco Nordio	COMUNE S. Anna di Chioggia	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 1 m	I.G.M. 169-I	RACCOGLITORE Carlo Montagna	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☒ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Pino e Leccio (prevalenti)		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☒ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO


VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti in più occasioni ripetute fruttificazioni di numerosi esemplari.



MICROSCOPIA: Spore cilindrico-ellissoidali, guttulate, 8.4-10.5 x 5.0-5.6 µ.

BIBLIOGRAFIA : ROBICH G. – MYCENA D'EUROPA – A.M.B.

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

CISTIDI

BASIDI (STERIGMI)

EPICUTE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo campanulato, di 1-1.5 cm di diametro, umbonato; cuticola biancastra, ma ocra-bruno nella regione discale, striata per trasparenza.

Imenoforo a lamelle adnate, strette, alternate a brevi lamellule; bianche (funghi giovani), con filo concolore.

Stipite cilindrico, slanciato, vagamente flessuoso, leggermente pruinoso, colore da biancastro a grigio-bruno nei 2/3 inferiori; secernente lattice biancastro.

Carne sottile, secernente liquido biancastro.

Microscopia. Spore cilindrico-ellissoidali, lisce, ialine, guttulate, 8.4-(9.28)-10.5 x 5.0-(5.29)-5.6 μ , con Q: 1.51-(1.76)-2.02; basidi clavati, tetrasporici; cistidi ventricoso-fusiformi, 54-72 x 10.3-14.9 μ ; epicure a ife $\pm$ parallele, strato esterno a ife diverticolate.