

SCHEDA N° 0511 AMS_PD
ORDINE Tricholomatales

GENERE <i>Mycena</i>	SPECIE <i>zephirus</i>	AUTORE (Fr.) P. Kumm.	
DATA DI RACCOLTA 14.10.2019	LUOGO DI RACC. Ljubno	COMUNE Ljubno	PROV. SLO
ALTITUDINE S.L.M. 550 m	I.G.M.	RACCOGLITORE GdS	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete bianco e Faggio		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti 2 gruppi di 6-8 esemplari ciascuno.



MICROSCOPIA: Spore cilindriche, con guttula centrale o contenuto granulare, 8.4-11.0 x 3.7-4.6 µ.

BIBLIOGRAFIA : ROBICH G. – MYCENA D'EUROPA – A.M.B.

DETERMINATORE GdS

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

CISTIDI

EPICUTE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo emisferico, spesso con mammellone centrale, di circa 2.5 cm di diametro; cuticola glabra, striata per trasparenza, biancastra, bruno-rossiccia nella regione discale, con chiazze rossastre (negli esemplari adulti); orlo sottile e chiaro.

Imenoforo a lamelle adnate o ascendenti con dentino, alternate a lamellule, intervenate; bianche, filo concolore, con chiazze bruno-rossastre con l'età.

Stipite cilindrico, slanciato, allargato alla base; di colore biancastro nella regione superiore, bruno-lilla in quella inferiore, con fibrille isolate biancastre (negli esemplari giovani) e base ricoperta da peluria biancastra.

Carne sottile, con odore e sapore non significativi.

Microscopia. Spore cilindriche, lisce, con evidente guttula centrale oppure a contenuto granulare, amiloidi, con apicolo contenuto, di $8.4\text{--}(9.67)\text{--}11.0 \times 3.7\text{--}(4.09)\text{--}4.6 \mu$, con Q: $2.17\text{--}(2.34)\text{--}2.73$; basidi strettamente claviformi, tetrasporici, $26.0\text{--}28.0 \times 5.5\text{--}7.0 \mu$; cistidi polimorfi (fusiformi, utriformi, ventricosi) con 1-3 protuberanze arrotondate, $38.8\text{--}44.0 \times 12.5\text{--}15.8 \mu$; ife dell'epicute cilindriche, lisce o con leggere incrostazioni e/o rare escrescenze.