

SCHEDA N° 0491 AMS_PD
ORDINE Thelephorales

GENERE Phellodon	SPECIE niger	AUTORE (Fr.) P. Karst.	
DATA DI RACCOLTA 16.10.2019	LUOGO DI RACC. Ljubno	COMUNE Ljubno	PROV. SLO
ALTITUDINE S.L.M. 450 m	I.G.M.	RACCOGLITORE GdS	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete bianco e Faggio		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO



VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuta una fruttificazione di una decina di esemplari sotto Faggio.

MICROSCOPIA: Spore subglobose, spinulose, 3,9-4,9 x 3,6-4,3 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREINTENBACH J., KRANZLIN F. – FUNGI OF SWITZERLAND (2) - MYCOLOGIA

DETERMINATORE GdS

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

EPICUTE (CON TERMINALI)

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo stipitato, $\pm$ (irregolarmente) tondeggiante, con depressione centrale, di circa 5-6 cm negli esemplari maggiori; cuticola rugosa, leggermente feltrata, di colore nero-bluastrò, con zonature brunastre; margine sottile, biancastro.

Imenoforo costituito da aculei decorrenti, di colore bianco-grigiastro.

Stipite cilindrico, piuttosto corto, feltrato, di colore nerastro.

Carne suberosa, di colore bruno-nerastro; odore caratteristico di brodo, sapore amarognolo.

Microscopia. Spore subglobose, spinulose, ialine, di $3.9\text{--}(4.46)\text{--}4.9 \times 3.6\text{--}(3.99)\text{--}4.3 \mu$, con Q: $1.05\text{--}(1.14)\text{--}1.24$; basidi sub cilindrici, tetrasporici, $28\text{--}30 \times 5\text{--}7 \mu$, privi di GaF; ife subimeniali a struttura monomitica, con parete sottile, prive di GaF.