

SCHEDA N° 0134 AMS_PD
ORDINE Cortinariales

GENERE Pholiotina	SPECIE aporos var. aporos	AUTORE (Kits van Wav.) Cléménçon	
DATA DI RACCOLTA 02.06.2023	LUOGO DI RACC. Lavarone	COMUNE Lavarone	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1200 m	I.G.M. 081-I	RACCOGLITORE Franco Fratta	






HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI : Abete rosso misto a Faggio		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : **Rinvenuti alcuni esemplari lungo un camminamento.**
MICROSCOPIA: **Spore irregolarmente ellissoidali, lisce, a parete spessa, con breve apicolo, 7.5-8.5 x 4.3-5.0 µ.**
BIBLIOGRAFIA : **HAUSKNECHT A. – CONOCYBE PHOLIOTINA - FUNGI EUROPAEI**
DETERMINATORE **Franco Fratta**
RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

CHEILOCISTIDI

CAULOCISTIDI

EPICUTE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo conico campanulato, di 2-3 cm di diametro; igrofano, debolmente striato al margine, di colore bruno castagna; margine sottile, appena un po' crenulato.

Lamelle brevemente adnate, alternate a lamellule, ventricose; di colore brunastro, con filo chiaro.

Stipite slanciato, sottile, cilindrico, con lieve ingrossamento basale; brunastro, più scuro nella regione sottoanulare, dove appare longitudinalmente striato, biancastro alla base; anello persistente, flocculoso, striato nella faccia superiore.

Carne molto esile, con odore e sapore deboli.

Microscopia. Spore irregolarmente ellissoidali, lisce, a parete spessa, con breve apicolo, prive di poro germinativo, di $7.5-(7.99)-8.5 \times 4.3-(4.64)-5.0 \mu$, con Q: 1.51-(1.72)-1.93; basidi clavati, tetrasporici, $22.0-25.5 \times 7.0-8.0 \mu$; cheilocistidi cilindrici, sinuosi, con apice rastremato; presenti caulocistidi; tutte le strutture dotate di GaF; epicute con cellule globose allungate.