

SCHEDA N° 0827 AMS_PD

ORDINE Tricholomatales

GENERE Pleurotus	SPECIE ostreatus	AUTORE (Jacq.) P. Kumm. 1871	
DATA DI RACCOLTA 10.11.2024	LUOGO DI RACC. Sant' Elena	COMUNE Monselice	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 12 m	I.G.M. 168-IV	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☒ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI :		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☒ SU LEGNO	☐ VIVO ☒ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : Rinvenuti numerosi esemplari sovrapposti su tronco in via di disfaccimento.

MICROSCOPIA: Spore da ellissoidali a subcilindriche, apicolate, 7.8-9.5 x 3.5-4.5 µ.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1) – A.M.B

DETERMINATORE **Vitaliano Milanese**


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI



CARPOFORI



SPORE



BASIDI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo di forma petaloide, con orlo sottile (funghi non giovani); cuticola glabra, di aspetto grasso, separabile, di colore grigio-bruno.

Lamelle fortemente decorrenti, spesse, biancastre, alternate a lamellule di varia lunghezza; filo intero.

Stipite laterale, molto breve, di colore biancastro.

Microscopia. Spore da ellissoidali a subcilindriche, apicolate, di $7.8-(8.51)-9.5 \times 3.5-(4.08)-4.5 \mu$, con Q: $1.88-(2.09)-2.42$; basidi cilindrici, tetrasporici.