

SCHEDA N° 0518 AMS_PD
ORDINE Pluteales

GENERE <i>Pluteus</i>	SPECIE <i>romellii</i>	AUTORE (Britzelm.) Sacc.	
DATA DI RACCOLTA 13.08.2019	LUOGO DI RACC. Passo Pinei	COMUNE Castelrotto	PROV. BZ
ALTITUDINE S.L.M. 1300 m	I.G.M. 027-II	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete rosso (per lo più) misto a Betulla		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☒ SU LEGNO	☐ VIVO ☒ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Betulla e Pino.





NOTE : Rinvenuti due esemplari su residui legnosi interrati.

MICROSCOPIA: Spore da largamente ellissoidali a subglobose, 5.3-6.9 x 5.2-6.4 µ.

BIBLIOGRAFIA : BREITENBACH J., KRANZLIN F., FUNGI OF SWITZERLAND (4)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

BASIDI

CHEILOCISTIDI

SPORE

EPICUTE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo appianato, con leggera depressione centrale e ampio umbone poco appariscente, di circa 3-4 cm; cuticola asciutta e leggermente corrugata, di colore bruno, più chiaro verso il margine; orlo brevemente indentato.

Lamelle libere, arrotondate al gambo, intercalate a lamellule di lunghezza diversa, di colore bianco-giallino; filo intero, irregolare.

Stipite slanciato, fragile, progressivamente ingrossato verso la base; di colore giallo, con fibrille longitudinali biancastre, molto fitte alla base (quasi costituenti una pruina).

Microscopia. Spore da largamente ellissoidali a subglobose, lisce, di $5.3-(6.2)-6.9 \times 5.2-(5.72)-6.4 \mu$, con Q: $1.0-(1.08)-1.19$; basidi cilindrico-clavati, tetrasporici, $23-25 \times 7-8 \mu$, privi di GaF; cheilocistidi vescicolosi o piriformi, $29.4-56.2 \times 10.2-25.5 \mu$, privi di GaF; struttura esterna della cuticola costituita da ife subglobose.