

**SCHEDA N° 0147 AMS\_PD**
**ORDINE Agaricales**

|                                    |                                    |                                        |                 |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>GENERE</b> <i>Psathyrella</i>   | <b>SPECIE</b> <i>spintrigera</i>   | <b>AUTORE (Fr.)</b> Konrad & Maubl.    |                 |
| <b>DATA DI RACCOLTA</b> 27.04.2013 | <b>LUOGO DI RACC.</b> Bosco Nordio | <b>COMUNE</b> S.Anna di Chioggia       | <b>PROV.</b> VE |
| <b>ALTITUDINE S.L.M.</b> 1 m       | <b>I.G.M.</b> 169-I                | <b>RACCOGLITORE</b> Vitaliano Milanese |                 |

**HABITAT:**

|                                          |                                                              |                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI    | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI                     | <input checked="" type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA        |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO    | <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO         | <input type="checkbox"/> ARENILE                             |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA        | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A                 |                                                              |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO                      | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO                     |
| <b>BOSCO DI :</b>                        |                                                              | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO                | <input type="checkbox"/> IN RADURE                           |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO        | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI                                                           |

**ESPOSIZIONE:**
☒ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☐ MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☒ ASCIUTTO ☐ SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :**
**NOTE :** Colorazione pileale degradata a ocra pallido dopo 3-4 ore.

**MICROSCOPIA:** Spore ellissoidali, con poro germinativo, 6.8-7.9 x 4.4-4.9 µ.


**BIBLIOGRAFIA :** MOSER M. – GUIDA ALLA DETERMINAZIONE DEI FUNGHI

**DETERMINATORE** Vitaliano Milanese

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI** ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

**CARPOFORI**

**SPORE**

**CHEILOCISTIDI**

**PILEIPELLIS**

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)</b> |
|----------------------------------------------|

**Pileo.** Sferico-campanulato, di c.a. 2 cm. di diametro negli esemplari giovani, fino a 3.5 cm. in quelli adulti; di colore dattero (più chiaro al centro), degradante a ocre asciugandosi; presenti residui distribuiti di velo negli esemplari giovanili, mantenuti solamente al bordo pileale in quelli più anziani.

**Microscopia.** Spore ellissoidali, con poro germinativo piuttosto evidente, di  $6.8-7.9 \times 4.4-4.9 \mu$ , con Q: 1.53-1.7; cheilocistidi da cilindrico-clacati a cilindrico-utriformi; cuticola pileale con cellule subsferiche-piriformi.