

SCHEDA N° 0540 AMS_PD
ORDINE Agaricales

GENERE <i>Psathyrella</i>	SPECIE <i>subatrata</i>	AUTORE (Batsch) Gillet	
DATA DI RACCOLTA 11.10.2019	LUOGO DI RACC. Posina	COMUNE Posina	PROV. VI
ALTITUDINE S.L.M. 500 m	I.G.M. 102-I	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Latifoglie (prev. Pioppo, Castagno) e qualche Abete		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☒ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Pioppo (prevalente).




NOTE : Rinvenuti una decina di esemplari tra le foglie al margine di un sentiero.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, con apicolo e poro germinativo, 13.2-16.5 x 8.3-9.2 µ.

BIBLIOGRAFIA : MOSER M. – GUIDA ALLA DETERMINAZIONE DEI FUNGHI – SATURNIA

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

CISTIDI

SETAE

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo conico-campanulato, di circa 3 cm di diametro; superficie liscia, igrofana, di colore bruno (tempo umido) con regione apicale ocracea, striata per circa metà del raggio; orlo sottile, grigio pallido.

Lamelle adnate, alternate a lamellule, leggermente ventricose; di colore grigiastro con filo lamellare biancastro, leggermente crenulato.

Stipite cilindrico, cavo, con base (talora) appena bulbosa; di colore bianco-grigiastro; apice leggermente pruinoso, base con peluria irta bianca.

Carne con odore e sapore non significativi.

Microscopia. Spore ellissoidali, con apicolo e poro germinativo, di 13.2-(15.42)-16.5 x 8.3-(8.71)-9.2 μ , con Q: 1.38-(1.78)-1.92; basidi tetrasporici, clavati; cheilocistidi da lageniformi a utriformi, 42.0-46.0 x 14.5-17.0 μ ; epicute costituita da ife globoso-piriformi, presenti numerose setae brunastre a parete spessa, lunghe fino a 310 μ .