

SCHEDA N° 0549 AMS_PD
ORDINE Clavariales

GENERE Ramaria	SPECIE flava	AUTORE (Schaeff.) Quél.	
DATA DI RACCOLTA 19.07.2020	LUOGO DI RACC. Vodo di Cadore	COMUNE Vodo di Cadore	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1280 m	I.G.M. 029-II	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	



HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Abete rosso, Nocciolo, Faggio		☒ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : **Rinvenuti tre esemplari ai bordi di un sentiero sotto Abete rosso.**
MICROSCOPIA: **Spore cilindrico-ellissoidali, verrucose, guttulate, 10.2-14.2 x 3.6-4.6 µ.**
BIBLIOGRAFIA : **CONSIGLIO G., PAPETTI C. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (2)**
DETERMINATORE **Vitaliano Milanese**
RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

IFE (GAF)

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Basidiocarpo a forma di cavolfiore, originato da una base spessa e tendenzialmente bulbosa; rami iniziali spessi, successivamente suddivisi in rami più esili, con selle miste a U e V, elementi terminali costituiti da 2-3 punte molto brevi; colore giallo non molto carico, zone lesionate bruno vinoso; carne bianca.

Microscopia. Spore cilindrico-ellissoidali, ialine, verrucose, guttulate, di 10.2-(11.26)-14.2 x 3.6-(4.19)-4.6 μ , con Q: 2.22-(2.71)-3.27; basidi terasporici; ife dei rami solo talora dotate di GaF.