

SCHEDA N° 0534 AMS_PD
ORDINE Pluteales

GENERE Volvariella	SPECIE gloiocephala	AUTORE (DC.) Boekhout & Enderle	
DATA DI RACCOLTA 25.10.2019	LUOGO DI RACC. Parco cittadino	COMUNE Rubano	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 15 m	I.G.M. 126-II	RACCOGLITORE Vitaliano Milanese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTIE GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☒ ARGINE DI Fiume	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI:		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:
☒ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO




VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :
NOTE : Rinvenuti numerosi esemplari, sul bordo di un fossato.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, lisce, a parete spessa, 13.7-16.6 x 8.4-9.8 µ.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA (1)

DETERMINATORE Vitaliano Milanese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI

CARPOFORI

SPORE

BASIDI

CHEILOCISTITI

DESCRIZIONE (ASPETTI CARATTERIZZANTI)
--

Pileo piano depresso (funghi adulti), di circa 5 cm di diametro, dotato di largo umbone; cuticola fibrillosa, con aspetto lubrificato, di colore grigio-ocraceo (più marcato nella nella regione centrale); orlo regolare, sottile.

Imenio con lamelle libere al gambo, molto fitte, intercalate a lamellule, di colore grigio-rosato.

Stipite cilindrico, molto slanciato, finemente fibrilloso, con base un po' bulbosa, di colore biancastro; presente una **volva** membranosa, inguainante, di colore biancastro.

Carne bianca, fragile, ma fibrosa nello stipite; odore leggero.

Microscopia Spore ellissoidali, lisce, a parete spessa, apicolate, di 13.7-(15.49)-16.6 x 8.4-(9.28)-9.8 μ , con Q: 1.56-(1.67)-1.77; basidi tetrasporici, clavati (rigonfiamento centrale), 35.0-40.0 x 13.0-14.0 μ ; cheilocistidi per lo più clavati e talora dotati di evidente apicolo, 25.0-32.0 x 13.5-15.0 μ ; pleurocistidi simili ma privi di apicolo e tendenzialmente fusiformi.